

FICHE D'INFORMATION PATIENTS

TRAITEMENT PAR IMIQUIMOD (ALDARA®)

MALADIE DE PAGET ANO-GENITALE

Qu'est-ce que l'imiquimod (ALDARA®) ?

Votre dermatologue vous a prescrit un traitement par la crème ALDARA® pour traiter une maladie de Paget de la région ano-génitale. Cette crème déclenche une réaction immunitaire de votre organisme, afin d'attaquer les cellules cancéreuses.

COMMENT SE DÉROULE LE TRAITEMENT ?



Le dermatologue

Suivez les prescriptions de votre dermatologue.



Quantité

En général, la crème ALDARA® doit être appliquée 3 fois par semaine, par exemple : le lundi, le mercredi, le vendredi. Si besoin, la fréquence d'application pourra être augmentée (5 fois par semaine, du lundi au vendredi).



Application

La crème est appliquée le soir au coucher. Lavez-vous les mains et la zone à traiter, à l'eau et au savon doux, puis séchez. Appliquez la crème en quantité suffisante pour couvrir toute la zone à traiter, avec une marge de 1 cm tout autour de la zone à traiter. La crème ne doit pas être appliquée sur l'urètre, dans le vagin, dans l'anus. La dose maximale par application est d'un sachet. Appliquez la crème jusqu'à pénétration. Jetez le sachet après utilisation (il ne doit pas être réutilisé une fois ouvert). Lavez-vous les mains après application. La crème doit rester en contact environ 8 heures avec la zone à traiter, donc jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, enlevez la crème avec de l'eau et du savon.



Durée

La durée du traitement par ALDARA® est de 3 à 4 mois.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?

Les effets secondaires lors du traitement par ALDARA® peuvent être :

➤ **une réaction locale** : rougeur, brûlure, érosions, cloques, croûtes... Il s'agit de réactions fréquentes, similaires à des brûlures, qui sont le signe d'une bonne efficacité du traitement par ALDARA®.

Ceci n'est pas une allergie, et ne doit pas faire arrêter le traitement par ALDARA®.

Si la douleur est trop importante, ou s'il y a des signes d'infection, une pause de quelques jours permet d'améliorer l'état local, et de reprendre ensuite le traitement par ALDARA®.

➤ **plus rarement, il peut y avoir de la fièvre ou une sensation grippale**, à traiter avec du paracétamol, et à signaler à votre médecin.

Comment est évaluée l'efficacité du traitement ?

L'efficacité de l'ALDARA® n'est pas maximale dans les suites immédiates du traitement ; il peut y avoir encore des irritations locales.

L'efficacité du traitement sera évaluée environ trois mois après l'arrêt du traitement. En cas d'efficacité incomplète, votre dermatologue pourra vous proposer un autre traitement.

Quelles sont les autres mesures à mettre en place ?

Votre dermatologue pourra vous prescrire :

➤ un savon nettoyant doux et une crème apaisante, pour diminuer les irritations et les douleurs liées à la réaction locale. Vous pourrez utiliser le savon doux pour la toilette deux fois par jour, et la crème apaisante plusieurs fois par jour,

➤ du paracétamol, pour diminuer les douleurs.

La crème ALDARA® doit être éliminée par lavage avant toute activité sexuelle. La crème peut fragiliser les préservatifs et diaphragmes ; par conséquent, d'autres méthodes de contraception doivent être envisagées.