

# FICHE D'INFORMATION PATIENTS

## TRAITEMENT PAR FOTEMUSTINE (MUPHORAN®)

### Qu'est-ce que la fotemustine (MUPHORAN®) ?

Votre médecin vous a proposé une chimiothérapie par MUPHORAN® pour un mélanome métastatique. Cette chimiothérapie est toxique pour les cellules cancéreuses et peut freiner leur multiplication.

### Comment est administré le traitement ?

Le MUPHORAN® vous sera administré par voie intraveineuse. Le MUPHORAN® pourra être administré à doses rapprochées (« phase d'attaque ») : 3 perfusions, administrées tous les 8 jours pendant deux semaines. Après une pause de 4 à 5 semaines, le traitement « d'entretien » sera une perfusion de MUPHORAN® tous les 21 jours.

Selon les cas, le médecin peut vous prescrire d'emblée le MUPHORAN® à la dose d'entretien : une perfusion tous les 21 jours, sans réaliser la « phase d'attaque ».

### LE SCHÉMA D'ADMINISTRATION DES INJECTIONS EST LE SUIVANT :



### Quels sont les effets indésirables de ce traitement, et que faire s'ils surviennent ?

#### FATIGUE 1

Elle peut être liée au traitement mais également à la maladie.

Soyez à l'écoute de votre corps. Maintenez une activité physique, un sommeil suffisant de nuit et des temps de repos adaptés en journées. Faites-vous plaisir.

Informez votre médecin en cas de fatigue inhabituelle ou persistante.

#### NAUSÉES, VOMISSEMENTS 2

Des médicaments préventifs de la nausée et des vomissements seront systématiquement prescrits le jour de la perfusion et dans les jours suivants.

En cas de survenue de nausées, ou en préventif :

- fractionnez vos repas : prenez plusieurs petits repas tout au long de la journée,
- fractionnez la prise de boissons : la prise d'eau gazeuse ou de sodas peut diminuer les nausées
- essayez de boire 1,5 l de liquide sur la journée
- écoutez vos envies : privilégiez les aliments qui vous font envie, sucrés ou salés,
- préférez les plats froids ou tièdes aux plats chauds,
- prenez les médicaments anti-nausées prescrits par votre médecin : ils peuvent être prescrits sous forme de comprimé à faire fondre sous la langue.

#### PERTE D'APPÉTIT, PERTE DE POIDS 3

Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.

Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel (selon vos envies)... Demandez les conseils d'une diététicienne.

## Quels sont les effets indésirables de ce traitement, et que faire s'ils surviennent ? (suite)

### 4 DIMINUTION DES GLOBULES ROUGES, DES GLOBULES BLANCS ET/OU DES PLAQUETTES

Il s'agit d'une toxicité possible de la chimiothérapie, à confirmer par une prise de sang.

Consultez votre médecin traitant ou contactez le service en cas de : pâleur, essoufflement, fièvre >38,5°C durant plus de 24 heures, apparition d'ecchymoses ou de saignements inhabituels.

Dans tous les cas, vous devrez faire une prise de sang dans un laboratoire d'analyses, environ 3 jours avant chaque perfusion. La perfusion de MUPHORAN® pourra être annulée et décalée en cas de diminution importante des chiffres des globules.

Dans ce cas, vous devrez faire une prise de sang de contrôle, pour pouvoir reprendre la chimiothérapie quand la prise de sang sera normalisée.

### 5 INFECTIONS FIEVRE

Comme la chimiothérapie baisse votre défense immunitaire, des infections sont possibles notamment si les globules blancs sont bas. En cas de température > 38,5°C, veuillez consulter votre médecin généraliste qui jugera si un traitement antibiotique est nécessaire. Lors de votre venue suivante à l'hôpital, parlez à votre dermato-oncologue de la nature, de la durée et de la fréquence des infections que vous avez eues. Il est très important de le signaler au cas où vous vous sentiriez malade le jour d'une perfusion de chimiothérapie prévue.

## Quelles sont les autres mesures à mettre en place ?

- › Le médecin peut vous proposer la pose d'une chambre implantable (PAC). Il s'agit d'un petit boîtier placé sous la peau de votre thorax, qui donne accès directement à une veine profonde. Ce boîtier est posé sous anesthésie locale. Il s'agit d'une opération simple et rapide. Les perfusions se font ensuite dans le boîtier. Ceci permet d'éviter d'abîmer les veines du bras.
- › Une contraception devra être mise en place pendant le traitement car la chimiothérapie peut être toxique pour le fœtus. Si vous êtes en couple et en âge de procréer, choisissez une méthode de contraception fiable que vous pourrez utiliser pendant toute la durée des traitements. Ces consignes sont également valables pour les conjointes des hommes traités par chimiothérapie. Si le sujet vous préoccupe, discutez-en avec votre médecin.
- › Ce traitement peut avoir un impact sur votre fertilité, une consultation dédiée pourra vous être proposée dans un centre spécialisé.
- › Les vaccinations habituelles (grippe, COVID-19, éventuellement pneumocoque) peuvent être réalisées au cours de la chimiothérapie ; elles sont même conseillées, la maladie et les traitements vous rendant plus fragiles aux infections.

## Comment sera évaluée l'efficacité de ce traitement ?

L'évaluation des résultats de la chimiothérapie se fait en général après 3 mois de traitement, par des examens complets (parmi scanner corps complet, TEP-scanner, IRM cérébrale...).