

FICHE D'INFORMATION PATIENTS

DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE (CAELYX®)

De quel type de traitement s'agit-il ?

Il s'agit d'une chimiothérapie qui freine la multiplication des cellules cancéreuses.


Comment est administré le traitement par CAELYX® ?

Dans la majorité des cas le traitement sera administré en perfusion sur votre chambre implantable (ou PAC*). Votre chimiothérapie sera administrée sous forme de cycles (ou cures) : toutes les 3 semaines sous forme d'une perfusion de 2 à 3 heures.

Ce schéma d'administration pourra être modifié en fonction des cas.

Il n'est pas nécessaire de vous présenter à jeun pour votre traitement.

LE SCHÉMA D'ADMINISTRATION DES INJECTIONS EST LE SUIVANT :



Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ? Et quelles sont les précautions à prendre ?

Il est important que vous les connaissiez pour que vous puissiez avertir l'équipe soignante lors de leur survenue. L'équipe vous guidera dans la gestion de ces effets secondaires.

1 RÉACTION ALLERGIQUE

Pendant la perfusion ou immédiatement après, est limité par l'administration d'un traitement antiallergique avant la perfusion. Les symptômes peuvent se manifester par des difficultés respiratoires de type asthme ou œdème du visage, une chute de la tension artérielle, urticaire, une fièvre ou des frissons.

La surveillance de la tension par l'infirmière est systématique. Le débit (vitesse) de la perfusion est ajusté à la tolérance.

2 SYNDROME MAINS PIEDS : SÈCHESSE ET ROUGEUR DE LA PEAU

Des soins de pédicure pourront être réalisés avant la chimiothérapie. Éviter le chaussures serrantes et les hauts talons. Éviter l'exposition des mains et des pieds à la chaleur et au froid intenses. Utiliser un savon surgras pour la toilette quotidienne. Utiliser généreusement une crème hydratante adaptée.

Un traitement par paracétamol peut être prescrit pour vous soulager.

3 NAUSÉES / VOMISSEMENTS

Avant chaque cycle de chimiothérapie, vous recevrez des médicaments contre les nausées, sous forme de comprimés ou en intraveineux. Manger lentement, et fractionner les repas. Éviter les aliments gras, frits et épicés.

Si les vomissements persistent, prévenir le médecin

4 RISQUE INFECTION

Limitez le contact avec des personnes malades ou contagieuses. Lavez-vous fréquemment les mains. Mettez à jour vos vaccinations.

Contrôlez votre température si vous vous sentez fébrile et prévenez votre médecin traitant si votre température dépasse 38°C
Une ordonnance pour une surveillance biologique régulière vous sera remise.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ? Et quelles sont les précautions à prendre ? (suite)

MUCITE/ APHTES

5

Évitez les irritants (alcool, tabac) et les aliments trop chauds, acides ou épicés. Préservez une bonne hygiène buccale.

Des bains de bouche peuvent vous être prescrits. Le froid soulage les aphtes (glaçons, boissons rafraîchissantes).

ALOPÉCIE (=PERTE DE CHEVEUX)

6

Préférez une coupe courte avant de commencer le traitement. Utilisez de préférence des shampoings doux, évitez brushing, permanente et coloration

Une perruque ou prothèse capillaire pourra être prescrite. Dans la grande majorité des cas, les cheveux repousseront après l'arrêt du traitement.

MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES

7

*Fourmillements
ou engourdissements
des doigts et des orteils,
des spasmes au niveau
de la bouche.*

Protégez-vous du froid, lavez-vous les mains à l'eau chaude. Porter des gants chauds pour accéder au réfrigérateur et congélateur.

En cas d'apparition des signes évoqués, vous devez le signaler à votre médecin. Ces symptômes diminuent peu à peu après l'arrêt du traitement mais des séquelles à long terme peuvent persister.

TROUBLES CARDIAQUES

8

*Douleurs thoraciques, palpitations, essoufflement,
gêne à la marche, fatigabilité inhabituelle, œdèmes
des membres inférieurs.*

Une évaluation de la fonction cardiaque est réalisée avant le traitement et si besoin en cours de traitement. En cas d'apparition des signes évoqués, contactez votre médecin immédiatement.

Quelles sont les autres mesures à mettre en place ?

- » Le médecin vous proposera la pose d'une chambre implantable (PAC). Il s'agit d'un petit boîtier placé sous la peau de votre thorax, qui donne accès directement à une veine profonde. Ce boîtier est posé sous anesthésie locale. Il s'agit d'une opération simple et rapide. Les perfusions se font ensuite dans le boîtier. Ceci permet d'éviter d'abîmer les veines du bras.
- » Une contraception devra être mise en place pendant le traitement car la chimiothérapie peut être toxique pour le fœtus. Si vous êtes en couple et en âge de procréer, choisissez une méthode de contraception fiable que vous pourrez utiliser pendant toute la durée des traitements. Ces consignes sont également valables pour les conjointes des hommes traités par chimiothérapie. Notez qu'il est conseillé d'attendre 6 mois après la fin des traitements avant d'essayer de concevoir un enfant. Si le sujet vous préoccupe, discutez-en avec votre dermatologue.
- » Les vaccinations habituelles (grippe, COVID-19, éventuellement pneumocoque) peuvent être réalisées au cours de la chimiothérapie ; elles sont même conseillées, la maladie et les traitements vous rendant plus fragiles aux infections.
- » Ce traitement peut avoir un impact sur votre fertilité, une consultation dédiée pourra vous être proposée dans un centre spécialisé.

Comment sera évaluée l'efficacité de ce traitement ?

L'évaluation des résultats du CAELYX® est faite régulièrement par un examen clinique, et éventuellement des examens d'imagerie.