

# THÉRAPIES CIBLÉES ANTI-BRAF / ANTI-MEK : TRAITEMENTS INTERDITS OU À UTILISER AVEC PRÉCAUTIONS

## INTERDIT - FORT INDUCTEURS DU CYP3A OU DU CYP2C8 : LES CONCENTRATIONS DE DABRAFENIB PEUVENT ÊTRE DIMINUÉES

| Classe            | Traitements                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Antibiotiques     | Classe des Rifamycines (e.g., rifampin, rifabutin, rifapentine),     |
| Anticonvulsivants | Carbamazepine, oxcarbazepine phenobarbital, phenytoin, s-mephenytoin |
| Divers            | bosentan, millepertuis                                               |

## À UTILISER AVEC PRÉCAUTION : INHIBITEURS MODÉRÉS DU CYP3A, OU DU CYP2C8 : LES CONCENTRATIONS DE DABRAFENIB PEUVENT ÊTRE AUGMENTÉES

| Classe           | Inhibiteurs modérés du CYP3A et du CYP2C8 |
|------------------|-------------------------------------------|
| Anti-arythmiques | Diltiazem, verapamil                      |
| Antibiotiques    | Erythromycin                              |
| Antifongiques    | Fluconazole                               |
| Divers           | Aprepitant, cimetidine, montelukast       |

## INTERDIT - FORT INHIBITEURS DU CYP3A, ET DU CYP2C8 : LES CONCENTRATIONS DE DABRAFENIB PEUVENT ÊTRE AUGMENTÉES

| Classe            | Traitements                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Antibiotiques     | Clarithromycin, telithromycin, troleandomycin          |
| Antidépresseurs   | Nefazodone                                             |
| Antifongiques     | Itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole |
| Hyperlipidémiants | Gemfibrozil                                            |
| Antirétroviraux   | Ritonavir, saquinavir, atazanavir                      |
| Divers            | Conivaptan                                             |

**A UTILISER AVEC PRÉCAUTION : LA CO-ADMINISTRATION  
DE CES TRAITEMENTS AVEC LE DABRAFENIB PEUT ENTRAINER  
UNE PERTE D'EFFICACITÉ.**

|                                                |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classe</b>                                  | CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, ou CYP2C19 susceptibles d'être affectés (induction)                                                                                                            |
| <b>Analgésiques</b>                            | Alfentanil, buprenorphine, celecoxib, codeïne, fentanyl, methadone, oxycodone                                                                                                                  |
| <b>Anti-arythmiques</b>                        | Disopyramide, dronedarone, mexiletine, propafenone, quinidine                                                                                                                                  |
| <b>Antibiotiques</b>                           | Chloramphenicol, doxycycline, erythromycin, moxifloxacin                                                                                                                                       |
| <b>Anticoagulants/<br/>Antiplaquettaires</b>   | Cilostazole, warfarin                                                                                                                                                                          |
| <b>Anticonvulsivant</b>                        | Divalproex, lamotrigine, valproate, zonisamide                                                                                                                                                 |
| <b>Antidépresseurs<br/>et Antipsychotiques</b> | Aripiprazole, bupropion, buspirone, desipramine, haloperidol, mirtazapine, pimozide, quetiapine, trazodone, amitriptyline, clomipramine, imipramine                                            |
| <b>Antidiabétiques</b>                         | Glyburide, saxagliptin, tolbutamide, nateglinide, pioglitazone, repaglinide, rosiglitazone                                                                                                     |
| <b>Antifongiques</b>                           | Caspofungin, fluconazole, terbinafine                                                                                                                                                          |
| <b>Antihistaminiques</b>                       | Astemizole, chlorpheniramine, ebastine                                                                                                                                                         |
| <b>Antihypertenseurs</b>                       | Amlodipine, diltiazem, felodipine, nifedipine, nilvadipine, nisoldipine, verapamil                                                                                                             |
| <b>Antimigraineux</b>                          | Diergotamine, eletriptan, ergotamine                                                                                                                                                           |
| <b>Corticostéroïdes</b>                        | Dexamethasone, methylprednisolone, oral budesonide                                                                                                                                             |
| <b>Dysfonction Erectile</b>                    | Sildenafil, tadalafil, vardenafil                                                                                                                                                              |
| <b>Inhibiteurs HMG-CoA<br/>Réductase</b>       | Atorvastatin, lovastatin, simvastatin, cerivastatin, rosuvastatin, pravastatin                                                                                                                 |
| <b>Hypnotiques et<br/>Sédatifs</b>             | Alprazolam, brotizolam, diazepam, estazolam, midazolam, triazolam, zolpidem, zopiclone                                                                                                         |
| <b>Immunosuppresseurs</b>                      | Everolimus, sirolimus, tacrolimus                                                                                                                                                              |
| <b>Divers</b>                                  | Aprepitant, cisapride, darifenacin, disopyramide, leflunomide, methohexital, oral contraceptives, quinine, ranitidine, solifenacin, sulfasalazine, tramadol, tolvaftan, chloroquine, zopiclone |
| <b>Antagoniste<br/>de l'aldostérone</b>        | Eplerenone                                                                                                                                                                                     |
| <b>Agents altérant le pH</b>                   | Dexlansoprazole, esomeprazole, famotidine, ilaprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole, ranitidine                                                                         |